

Филиал ООО «Johnson&Johnson» в Республике Казахстан

Терапевтически резистентная депрессия (ТРД)

Терапевтически резистентная депрессия (ТРД)

- ТРД можно определить как MDD у взрослых пациентов, которые не ответили, как минимум, на два различных вида терапии АД во время текущего депрессивного эпизода¹⁻³
 - Только 60–70 % пациентов с MDD отвечают на две линии терапии АД^{4,5}

Считается, что до трети пациентов
страдают ТРД

- У пациентов с ТРД симптомы могут сохраняться дольше, что ведет к ухудшению исходов¹, в том числе к развитию суицидального настроения¹

АД — антидепрессант; НЯ — нежелательное явление; ИМТ — индекс массы тела; MDD — большое депрессивное расстройство; ТРД — терапевтически резистентная депрессия.

1. Rizvi SJ, et al. *Can J Psychiatry* 2014; 59: 349-357; 2. Janssen. Esketamine DRAFT Summary of Product Characteristics. 2018; 3. European Medicines Agency. Guideline on clinical investigation of medicinal products in the treatment of depression. May 2013; 4. Al-Harbi KS. *Patient Prefer Adherence* 2012; 6: 369-388; 5. Rush J, et al. *Am J Psychiatry* 2006; 163: 1905-1917; .

Отсутствие ответа на терапию антидепрессантами


После получения двух линий терапии антидепрессантами только 60–70% пациентов с MDD достигают ответа^{1,2}

У оставшейся трети пациентов симптомы сохраняются более длительное время, что приводит к ухудшению исходов,¹ в том числе развитию суицидального настроения³

У пациентов с ТРД более сильно выражены симптомы по сравнению с пациентами, страдающими депрессией умеренной и легкой степени

Баллы в доменах шкалы SF-36v2 по группам степени тяжести депрессии согласно опроснику PHQ-9

Шкала SF-36v2 подразделяется на 8 отдельных субдоменов: физическое функционирование, боль в теле, общее состояние здоровья, физическая роль, эмоциональная роль, социальное функционирование, жизненный тонус и психическое здоровье. Эти баллы были нормированы, балл 50 соответствует среднему значению в общей популяции. Чем выше балл, тем лучше статус здоровья



Пациенты в группе с вероятной ТРД продемонстрировали повышенную степень тяжести во всех доменах, оцениваемых путем сравнения с показателями пациентов в группе отсутствия или минимальной степени депрессии. Особенно это было заметно в доменах психического здоровья (28,40 и 48,34), эмоциональной роли (29,86 и 47,91) и социального функционирования (30,72 и 48,23); $p < 0,001$ во всех доменах

Рисунок получен из Amos TB, et al. 2017

СЗКЖ — связанное со здоровьем качество жизни; PHQ-9 — опросник по состоянию здоровья пациентов, включающий 9 вопросов; SF36v2 — краткая форма опросника для оценки здоровья, включающая 36 вопросов, редакция 2; ТРД — терапевтически резистентная депрессия

Amos TB et al. Poster S2-067. Poster presented at the Anxiety and Depression Association of America (ADAA) Annual Conference, 6-9 April 2017, San Francisco, US.

В данном исследовании изучалась связь степени тяжести депрессии и исходов, связанных с состоянием здоровья и экономикой, у пациентов с MDD

Пациенты распределялись в следующие группы на основании текущего количества баллов согласно опроснику PHQ-9:

- Отсутствует или минимальная (балл по PHQ-9: 0–4)
 - Легкая степень (балл по PHQ-9: 5–9)
 - Умеренная степень (балл по PHQ-9: 10–14)
- Среднетяжелая или тяжелая степень (балл по PHQ-9: 15–27; или вероятная ТРД)

Результаты пациентов в каждой группе по степени тяжести депрессии сравнивались с результатами пациентов в группе отсутствия или минимальной степени депрессии

Пациенты в группе с вероятной ТРД отмечали более низкий уровень психического и физического СЗКЖ, большее количество времени отсутствия на рабочем месте или более значительное снижение продуктивности при нахождении на рабочем месте, а также более значительное нарушение выполнения повседневных действий по сравнению с пациентами в группе отсутствия или минимальной степени депрессии